

CALENDRIER VACCINAL DES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS ET MALADIES PREVENUES PAR LES DIFFERENTS VACCINS

Contact	Age	Antigènes	Objectif du vaccin
1	Naissance	BCG, VPO 0	<ul style="list-style-type: none"> - BCG : prévenir les formes graves de la tuberculose - VPO 0 : Prévenir la Poliomyélite et
2	8 semaines	Penta1, Pneumo1, Rota1, VPO1	<ul style="list-style-type: none"> - Penta : vaccin combiné contre la Diphtérie, le Tétanos, la Coqueluche, l'Haemophilus Influenza b, l'hépatite B. - Pneumo : Prévenir les infections à pneumocoques responsables de pneumonies, de méningites, d'otites moyennes etc. ; - Rota : Prévention des gastroentérites de sévérité moyenne et grave dues au Rotavirus ; - VPO : Prévention de la poliomyélite
3	12 semaines	Penta2, Pneumo2, Rota2, VPO2	
4	16 semaines	Penta3, Pneumo3, Rota3, VPO3	
5	9 mois	RR1 et VAA	<ul style="list-style-type: none"> - RR : vaccin combiné contre la Rougeole et la Rubéole - VAA : Prévenir la fièvre jaune.
6	15 mois	RR2 ¹	

CALENDRIER VACCINAL DES FEMMES ENCEINTES

Contact	Age	Antigènes
1	Dès que possible	VAT1
2	4 semaines après la première dose, mais pas plus tard que deux (2) semaines avant la date prévue pour l'accouchement	VAT2
3	Six (6) mois au moins après la deuxième dose	VAT3
4	Un (1) an après la troisième dose	VAT4
5	Un (1) an après la quatrième dose	VAT5

Le vaccin anti tétanique (VAT) prévient le tétanos néonatal

¹ A partir du mois de février 2017, la direction de la prévention par la vaccination envisage d'ajouter le MenAfriVac™ au calendrier vaccinal et il sera administré au 15^e mois comme le RR2.